

KLNIKA ZA BOLESTI ZAVISNOSTI

INSTITUTA ZA MENTALNO ZDRAVLJE

Kliničko odeljenje za bolesti zavisnosti:

- **Indikacije** za prijem na odeljenje:

1. Svi oblici zavisnosti, osim opijatskih zavisnika

- Neophodno je da pacijent ima saradnika u lečenju (*osoba kojoj se ne otvara istorija bolesti, ali ima ulogu tehničkog saradnika, a što je još važnije završava edukativni program da bi mogla da podrži pacijentovu apstinenciju posle otpusta*)

- **Kontraindikacije** za lečenje na odeljenju:

1. Opijatska zavisnost: uključuje heroin, morfijum, trodone, metadon, buprenorfin

2. Pacijenti u stanju akutne alkoholisanosti, odnosno aktuelno pozitivni na druge psihoaktivne supstance (*akutna alkoholisanost podrazumeva da je pacijent na pregledu pod dejstvom alkohola ili da je pio alkohol u poslednjih 24h, znači neophodno je u dispanzerskim uslovima uvesti adekvatnu terapiju za održavanje apstinencije, a prijem je moguć kod alkoholizma tek 3-5 dana nakon poslednjeg pijenja, a kod drugih PAS kada ne bude pozitivan na PAS, znači obavezan test na PAS pre prikaza za prijem na odeljenje*).

3. Pacijenti sa težim neurološkim oštećenjima koji zahtevaju intenzivni neurološki tretman

4. Pacijenti kod kojih je neophodan intezivan internistički tretman-dekompenzovana ciroza, akutni pancreatitis, neregulisani diabetes mellitus, dekompenzovana kardiološka stanja

5. Pacijenti sa demencijom

6. Pacijenti sa akutnom psihozom/psihotičnom simptomatologijom

7. Primarno drugi psihijatrijski poremećaj sa zloupotrebotom alkohola/PAS (npr. BAP)

Dnevne bolnice za bolesti zavisnosti:

- **Indikacije** za tretman:

1. Svi oblici zavisnosti, osim opijatskih zavisnika

- Neophodno je uključivanje kopacijenta u tretman (*porodično-bračna terapija, a termin kopacijent podrazumeva da se i njemu otvara istorija bolesti i sistem ga prepozna kao ravnopravnog pacijenta u tretmanu*)
- **Kontraindikacije** za lečenje:
 1. Opjatska zavisnost: uključuje heroin, morfijum, trodone, metadon, buprenorfin
 2. Pacijenti u stanju akutne alkoholisanosti, odnosno aktuelno pozitivni na druge psihoaktivne supstance
 3. Pacijenti sa težim neurološkim oštećenjima koji zahtevaju intenzivni neurološki tretman
 4. Pacijenti kod kojih je neophodan intezivan internistički tretman-dekompenzovana ciroza, akutni pancreatitis, neregulisani diabetes mellitus, dekompenzovana kardiološka stanja
 5. Pacijenti sa demencijom
 6. Pacijenti sa akutnom psihozom/psihotičnom simptomatologijom
 7. Primarno drugi psihijatrijski poremećaj sa zloupotrebotom alkohola/PAS (npr. BAP)

Prim. dr Ivica Mladenović
Načelnik Klinike za bolesti zavisnosti